

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

HOMEOPTIC[®]

COLÍRIO, SOLUÇÃO

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 2 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é HOMEOPTIC, colírio, solução e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar HOMEOPTIC, colírio, solução
3. Como utilizar HOMEOPTIC, colírio, solução
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar HOMEOPTIC, colírio, solução
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É HOMEOPTIC, colírio, solução E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em adultos e crianças com idade superior a 1 ano para vários tipos de irritação ou desconforto ocular (por esforço ocular, água do mar ou com cloro, fadiga ocular, ambientes com fumo).

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE UTILIZAR HOMEOPTIC, colírio, solução

Não utilize HOMEOPTIC, colírio, solução

- Se tem alergia às substâncias ativas ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Em crianças com menos de 1 ano.

Advertências e precauções

Se os sintomas piorarem ou persistirem por mais de 2 dias, deverá consultar o médico.

- Evite todo o contacto entre a ponta da unidose e o globo ocular ou as pestanas.

- Em caso de imitações purulentas (pálpebras coladas de manhã) ou caso o cora dor aguda ou feridas, consulte imediatamente um médico.

Outros medicamentos e HOMEOPTIC, colírio, solução

Caso sejam utilizados outros colírios, aguarde 15 minutos antes de aplicar Homeoptic, colírio, solução.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

3. COMO UTILIZAR HOMEOPTIC, colírio, solução

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Posologia

A dose recomendada é: Adultos e crianças com idade superior a 1 ano: 1-2 gotas em cada olho, 2 a 6 vezes por dia.

Após o desaparecimento dos sintomas, suspenda o tratamento.

Modo e via de administração

Uso oftálmico.

Lave as suas mãos.

De forma a administrar sempre uma solução estéril, deve utilizar um recipiente unidose novo em cada utilização.

Consulte as figuras para saber como utilizar o recipiente unidose.



1- Abra a saqueta.





2- Destaque um recipiente unidose do bloco.



3- Abra o recipiente unidose, torcendo o bocal.



4- Puxe para baixo a pálpebra inferior e olhe para cima. Instile 1 gota entre a pálpebra inferior e o globo ocular (ou seja, no saco conjuntival).

5- Feche cuidadosamente a saqueta que contém os restantes recipientes unidose, dobrando para baixo o lado aberto.

Se utilizar mais HOMEOPTIC, colírio, solução, do que deveria

Consulte o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de utilizar HOMEOPTIC, colírio, solução

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Em caso de dúvidas sobre este medicamento, consulte o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Não são esperados efeitos secundários. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, LP | Direção de Gestão do Risco de Medicamentos | Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) | Site da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoom>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR HOMEOPTIC, colírio, solução

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Antes da abertura da saqueta: este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Depois da abertura da saqueta: conserve os recipientes unidose não utilizados dentro da saqueta.

Após a abertura do recipiente unidose:

- Deve utilizar este recipiente unidose imediatamente.
- Elimine o recipiente unidose após a utilização.
- Não conserve para uso posterior.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Homeoptíc, colírio, solução

Para um recipiente unidose de 0,4 ml

- As substâncias ativas são *Euphrasia officinalis* 3 DH (0,004 g); *Calendula officinalis* 3 DH (0,001 g); *Magnésio carbonato* 5 CH (0,001 g).

- Os outros componentes são água purificada e cloreto de sódio.

Sem conservantes.

Qual o aspeto de HOMEOPTIC, colírio, solução e conteúdo da embalagem

Caixa de 10, 20 ou 30 recipientes unidose de 0,4 ml. Os recipientes unidose encontram-se embalados numa saqueta.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

BORON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - França

Fabricante:

BORON - ZAC des Frênes - 1 rue Edouard Buffard - 77144 Montévrain - França

Este folheto foi revisto pela última vez em 12/2018.

BOIRON®

